

## silversmygare

*Hesperia comma*Rödlista  
2010Livskraftig  
LCNära hotad  
NTSårbar  
VUStarkt hotad  
ENAkut hotad  
CRNationellt utdöd  
REKunskapsbrist  
DD

Silversmygaren trivs i öppna, torra miljöer. Arten har minskat under en lång följd av år och har sin huvudsakliga utbredning i kustområdena från Bohuslän till Uppland, samt i inlandet i ett stråk från Bohuslän till Sörmland.

## Livsmiljö och ekologi

Silversmygaren är en dagfjäril och hör till familjen tjockhuvuden. Den trivs i betade, oödslade och torra utmarker med klippor och stäppängar, samt i varma sandmarker som t.ex. igenväxande sandtakter, flygfält, sydvända väglänter och järnvägsbankar. Den optimala flygtiden infaller från mitten av juli till mitten av augusti. Arten är värmeälskande och väljer relativt små tuvor av färsvingel (*Festuca ovina*) som omges av relativt bar markyta. Honan placerar här sina ägg på enstaka strån nära markytan där de övervintrar. Äggen kläcks sannolikt under april och larven spinner då en liten tub som den vilar i när den inte är ute och äter gräs. Efter ca 14–15 veckor förpuppas larven i botten av en stor grästuva och efter ytterligare 2–4 veckor kläcks fjärilen. Varmt eftersommarväder under flera år på 2000-talet har sannolikt gjort spridning och populationstillväxt lättare. Minskningen av

habitat fortsätter dock i och med ökad nedläggningstakt och beskogning av avslutade sandtakter och andra öppna sandmarker.

## Utseende

Denna spetsvingade och kvicka fjäril kan knappast förväxlas med någon annan art om tillfälle ges att granska den sittande med hopfällda vingar. De mörkt gröntonade bakvingarna med vita prickar skiljer den tydligt från några vanligare arter. I övrigt är fjärilen orangebrun och hos hanen finns ett distinkt svart streck med vitt mittstrimma mitt på framvingen parallellt med vingens framkant. Underarten fjällsilversmygare (*Hesperia comma catena*) är mindre och mörkare grön på undersidan med svartkantade vita fläckar. Vingspannet är 25–32 mm.

## Utbredning


Arten har sin huvudsakliga utbredning i kustområdena från Bohuslän till Uppland, samt i inlandet i ett stråk från Bohuslän till Sörmland. På ett fåtal lokalklimatiskt gynnsamma platser längs fjällkedjan från Härjedalen till Abiskoområdet i Torne lappmark finns även underarten (*Hesperia comma catena*). Arten har efter några gynnsamma somrar på 2000-talet förstärkt sin population och utbredning i Sverige. Dock saknas senare fynd från Norra Svealand. Arten förväntas dock att minska framöver eftersom livsmiljöerna som den trivs i försvinner.

## Inventeringsmetod

Arten är vanlig på Öland och Gotland och på delar av fastlandet. Det är därför inte prioriterat att inventera arten i dessa områden. I övriga områden är det tillräckligt att notera om arten förekommer eller inte på lokalen.

## Referenser

Artfaktablad [silversmygare](#) ArtDatabanken, SLU 2010-01-19



Fynd från 2008-2010



Foto: Håkan Elmquist (sid 1) och Kerstin Martinsson (sid 2)

## Allmän information om Faunaväkteri

Syftet med faunaväkteri är att få kunskap om våra vilda djurs tillstånd, främst hotade arter. Genom att följa en population från år till år kan trender upptäckas och hot kan uppmärksammas. Därigenom underlättas arbetet med att bevara arterna. Förutom årlig övervakning av kända populationer innefattar faunaväkteri även återbesök av äldre fyndplatser och eftersök av nya populationer. All väkteriverksamhet sammanställs och tillgängliggörs i Artportalen och kan därmed användas inom naturvård och miljöövervakning. Verksamheten är ideell men samordnas av ArtDatabanken och Sveriges entomologiska förening.

Kontakt: [asa.hedin@slu.se](mailto:asa.hedin@slu.se)

[www.slu.se/artdatabanken](http://www.slu.se/artdatabanken)

[www.artportalen.se](http://www.artportalen.se)

[www.sef.nu](http://www.sef.nu)

## Bli faunavaktare!

Alla är välkomna att bli faunavaktare. Du behöver inte vara expert, ett naturintresse räcker. Välj din art på [artportalen.se](http://artportalen.se) där du får mer information om hur du blir faunavaktare.