


Skylt 46, Stinkflyn (skinnbaggar) i jordgubbar

Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.

Jordgubbsstinkfly, *Plagiognathus arbostorum*, är vanligast i södra Sverige medan ludet ängsstinkfly, *Lygus rugulipennis*, vållar störst skada i norra Sverige. Även andra arter kan förekomma.

Skadebild

Bären blir små, missbildade, med ett hårt parti med tätt sittande frön i spetsen, se bild. Både ungstadier och vuxna stinkflyn gör skada när de sticker in sin sugsnabel i växtvävnaden och suger växtsaft. De gör störst skada på försommaren.



Stinkflyskador på jordgubbar. (foto: S. Kalt)

Biologi

Jordgubbsstinkflyet övervintrar som ägg på plantorna. Äggen kläcks strax före blomningen. Jordgubbsstinkflyna är 3-4 mm långa, mörka med svartfläckiga gula ben. Nymferna (ungstadierna) är ljusare och gröna. De kan ha två generationer per år.

Ludet ängsstinkfly är 6 mm långt, mörkbrunt – rödbrunt - gråbrunt med en ljus w-formad teckning på ryggen. De har en generation per år och övervintrar som vuxna i barrskog.

Åtgärder

Täckning med fiberduk kan tillämpas mot ludet ängsstinkfly. Jordgubbsstinkfly motverkas genom kort omloppstid i odlingen. Ev. kemisk bekämpning görs strax före blomning.