

## Skylt 47, Jordgubbsvivel, *Anthonomus rubi*

Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.

Jordgubbsviveln, eller hallonblomviveln som den också kallas, är en liten skalbagge som angriper jordgubbar och hallon, ibland även odlade björnbär. Störst skada gör den i jordgubbar.

### Skadebild

Efter att hon lagt ett ägg i blomknoppen biter honan delvis av blomskaftet, så att de vissnande blomknopparna hänger kvar på plantan, se bild. En hona kan förstöra 100-150 blomknoppar. Angrepp är vanligast i äldre odlingar.



Åvbiten blomknopp. (Foto: S. Kalt)



Vuxen jordgubbsvivel. (Foto: S. Kalt)

### Biologi

Den fullbildade svarta, endast ca 3 mm långa skalbaggen är aktiv på våren före blomningen. Äggen läggs ett och ett i blomknoppar. Larven utvecklas inuti den vissnade blomknoppen och förpuppar sig också där. På sensommaren kläcks den nya generationen vuxna, som övervintrar i markens övre skikt.

### Åtgärd

Förnya odlingen efter två skördesäsonger. Öppna och blåsiga fält missgynnar vivlarna. Ev. kemisk bekämpning måste ske strax före blomning.