

Vintergäcksot


Urocystis eranthidis

Vintergäcksot sprids med smittade lökar och smittad jord. Sjukdomen hämmar återväxten i planteringar och kan på sikt slå ut dessa helt. Symptomen är observerbara under maj-juni.

SKADEBILD På blad, bladskaft och stjälkar bildas grå-svarta rundade eller avlånga svulster fyllda med sotsporer efter avslutad blomning i april-maj.

BIOLOGI Sotsvampen övervintrar i jorden som sotsporer eller i infekterade lökar och i växtrester. Sotsporerna sprider basidsporer med vinden. Dessa kan infektera nya plantor. Sotsvampar har endast en generation per år.

ÅTGÄRD Vid angrepp bör man flytta odlingsplatsen för vintergäck och plantera friska lökar i frisk jord.



Till vänster: Vissnande vintergäck med sot.
Till höger: Sotsporer omgivna av biceller.
Foto: Guy Svedelius

Skylt 28 – Växtskyddsstigen

Vill du veta mer?

Ring 040-41 55 95 och tryck in skyltens nummer.

MATERIAL Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen för Växtvetenskap. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltjfab.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.