

Poppelrost

Melampsora spp.

Angriper flera poppelarter däribland *Populus angulata*, *P. balsamifera*, *P. canadensis*, *P. berolinensis* och *P. nigra*.

SKADEBILD Från augusti till bladfall kan poppelbladens undersida lysa brandgula av rostsvampens sommarsporlager. Kraftiga angrepp kan leda till för tidigt bladfall.

BIOLOGI Den vanligaste arten *M. larici-populina* värdväxlar med lärk men kan även övervintra på nedfallna blad från vilka sporer sprids på våren. På lärkens barr bildas skålstrost med gula/orange fläckar.

ÅTGÄRD Kemisk bekämpning i plantskolor. Odlar resistent kloner.



Sommarsporlager på undersidan av poppel, *P. nigra*. Foto: Guy Svedelius

Skylt 2 – Växtskyddsstigen

Vill du veta mer?

Ring 040-41 55 95 och tryck in skyltens nummer.

MATERIAL Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen för Växtvetenskap. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltjfab.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.