

Rosrost

Phragmidium spp.

Vissa rosor är mycket mottagliga, t.ex. *R. foetida*, *R. glauca*, *R. pimpinellifolia*, *R. rubiginosa*, äpple-ros och *R. acicularis*, finnros. Symptomen är observerbara under maj-sept.

SKADEBILD Angreppen börjar på lågt sittande blad. Angripna blad faller av, skott angrips och deformeras och busken försvagas.

BIOLOGI Svampen fullbordar hela sin utveckling på rosorna. Rosten uppträder på våren i form av orangeröda sporkuddar (skålröst). Sommartid bildar den guldfärgade, senare svarta, sporbeläggningen på undersidan av bladen.

ÅTGÄRD Under och efter växtsäsongen bör nedfallna blad hopsamlas och oskadliggöras. Rosorna ska inte kvävegödas alltför rikligt, men ha god tillgång på kalium. Stora sortskillnader föreligger.



Gulorange sommar- och svarta vintersporlager på bladundersida. Foto: G. Svedelius

Skylt 39 – Växtskyddsstigen

Vill du veta mer?

Ring 040-41 55 95 och tryck in skyltens nummer.

MATERIAL Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen för Växtvetenskap. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltjfab.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.