

# Poppelmosaik

orsakad av *poplar mosaic carlavirus*,

## PopMV

Poppelmosaik är mer eller mindre utbredd i olika poppelarter. Några arter skadas mer än andra.

**SKADEBILD** Symptomen börjar på försommaren som ett diffust ljus fläckmönster. Senare på sommaren, när bladen är fullt utvuxna, blir fläckarna skarpa och syns som gula små streck längs mindre nerver, ibland som små ringar. De är mycket ojämnt fördelade; några blad är helt täckta med mosaik, medan andra kanske inte har en enda fläck.

**BIOLOGI** Främst sprids PopMV med vegetativ förökning, men även från början friska träd kan infekteras. Alltså borde det finnas en vektor, troligen en bladlus, men trots intensivt sökande har man ännu inte hittat någon skyldig art.

**ÅTGÄRD** Plantera bara certifierade träd!



Poppelmosaik. Foto: Guy Svedelius

**Skylt 66 – Växtskyddsstigen**  
För uppläsning av skylten  
**ring 040-41 55 95** och  
tryck in skyltens nummer.

**MATERIAL** Framtaget av Gunilla Åhman, ScanBi Diagnostics AB, Alnarp. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltjfak.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.