




Djurägarinformation

Addisons sjukdom

Addisons sjukdom är en sjukdom där binjurebarken gradvis bryts ner vilket leder till en successiv minskning av produktionen av hormonerna aldosteron och kortisol, vilka är livsviktiga för upprätthållande av saltbalans och stressanpassning.

Kliniska symtom uppträder först när 85-90% av binjurebarkens funktion gått förlorad. Tidiga tecken kan bestå av periodvis minskad ätlust, kräkningar och diarré, avmagring, trötthet och muskelsvaghet. Diagnosen är lätt att missa, vilket kan få ödesdigra konsekvenser då oupptäckt sjukdom kan leda till livshotande kollaps om inte adekvat behandling sätts in.

De flesta hundar diagnostiseras mellan 2 och 7 års ålder och vissa raser drabbas mer än andra. Väl upptäckt, kan Addisons sjukdom behandlas medicinskt med god prognos. Svårigheten ligger i att upptäcka sjukdomen.



Raser som löper ökad risk att drabbas av Addisons sjukdom är bl.a. storpudel och bearded collies. Överst till höger syns binjuren (gul), placerad intill njuren.

Addisons sjukdom diagnostiseras genom att mäta binjurens förmåga att producera kortisol.

Praktiskt betyder det att koncentrationen av kortisol i blodet mäts före och en timme efter injektion av syntetiskt adrenokortikotropt hormon (ACTH) vilket stimulerar kortisolfrisättning från binjuren. Detta test kallas för ACTH-stimulering.

Sökes!

- Hundar som diagnostiserats med Addisons sjukdom m.h.a. ACTH-stimuleringstestet, samt friska hundar över sju år som inte har några problem som involverar immunförsvaret t.ex. livmoderinflammation, upprepade öroninflammationer eller hudbesvär.

Av raserna...

- Storpudel
- Bearded collie
- Portugisisk vattenhund

Kontaktpersoner för addisonprojektet:

Katarina Tengvall, MSc, Doktorand Uppsala Universitet,
katarina.tengvall@imbim.uu.se

Jeanette Hanson, Leg vet, DVM, Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar,
jeanette.hanson@slu.se