

Skylt 45, Jorgubbskvalster, *Phytonemus pallidus fragariae*

Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil.

Jordgubbskvalster är ett dvärgkvalster som är allmänt förekommande i hela landet.

Skadebild

Angripna plantor får kraftigt hämmad tillväxt, se bild. Bladen blir deformerade, rynkiga och missfärgade med korta bladskäft. Bären blir små och torra. Angreppen brukar öka med plantornas ålder.



Kraftigt angripen jordgubbsplanta.
(Foto: E. Kärnestam)



Jordgubbskvalster
(Foto: E. Kärnestam)

Biologi

Jordgubbskvalster är 0,25 mm långa, ovala, färglösa – blekbruna, se bild. Dessa kvalster trivs, till skillnad från växthusspinnkvalster (som också angriper jordgubbar), i hög luftfuktighet och finns därför främst nere i beståndet. Där lägger de också sina ägg, de har flera generationer per år. Fullbildade kvalster övervintrar i plantans centrala delar. Jordgubbskvalster sprids med smittade plantor, vind och redskap.

Åtgärder

Plantera alltid friska plantor. Håll avstånd till äldre odlingar. Biologisk bekämpning med rovkvalster *Amblyseius* sp.