

Vinbärsbladlus

Cryptomyzus ribis

Bladlöss suger växtsaft och utsöndrar honungsdagg. Denna art har vinbär som vintervärd och lever på sommaren på ogräs (dån, plister m.fl.).

SKADEBILD På vinbär syns symptomen redan i maj. Hos röda vinbär får bladen röda bucklor, hos svarta vinbär gulgröna bucklor.

BIOLOGI Ägg finns endast som övervintningsstadium. De läggs på vinbärsskotten och kläcks på våren. Bladlössen sitter på bladundersidan i bucklorna och suger växtsaft. I början av juni flyttar bladlössen till sina sommarvärdar.

ÅTGÄRD Kräver i regel ingen bekämpning. Eventuellt plockas angripna blad i maj.



Överst: Angrepp av vinbärsbladlus på röda vinbär. Ovan: Bladlössen föder flera ungar varje dag.
Foto: Elisabeth Kärnestam

Skylt 21 – Växtskyddsstigen

Vill du veta mer?

Ring 040-41 55 95 och tryck in skyltens nummer.

MATERIAL Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU, Institutionen för Växtvetenskap. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltfak.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.