

## **Skylt 58, Bladfallsjuka på svarta vinbär och krusbär, *Drepanopeziza ribis*.**

Observera att nedanstående är ett underlag för inläsning av ljudfil

Sjukdomen förekommer ofta på mottagliga sorter. Gör stor skada regniga somrar. Angriper svarta- och röda vinbär samt krusbär.

Skadebild.

Bladen får glänsande mörkbruna knappnålsstora fläckar på bladens ovsida, se bild. I fläckarna syns blåslika upphöjningar som spricker upp. Vid kraftiga angrepp flyter fläckarna ihop till bruna gråsvarta partier och bladen torkar in och faller av. Bladfall leder till försämrad skörd.



**Svarta vinbärsblad med bladfläckar, Guy Svedelius**

Biologi

Svampen övervintrar på nedfallna blad. På undersidan av dessa bildas under våren skålformade fruktkroppar, apothecier, vilka sprider sporsäcksporer i fuktig väderlek. Sporererna är vindspridda och infekterar unga blad. På angripna blad bildas könlösa sporer (konidier) i de blåslika upphöjningarna på bladens ovan- och undersidor. Dessa sporer sprids inom buskarna genom regnstänk. Sporer infekterar bara bladens undersidor. Buskar i dålig kondition är särskilt mottagliga.

Åtgärder

Odlar motståndskraftiga sorter. Undvik mottagliga sorter som Stella-sorterna och Jänkisjärvi. Sjukdomen kan delvis förebyggas genom insamling och bortförsl av nedfallna blad före våren. Undvik täta planteringar och vindskyddade lägen. Bekämpa ogräs och sörj för god näringstillgång.