

Bladbränna

Guignardia aesculi

Sjukdomen angriper blad och bladskäft, kan vid starka angrepp avblada träden och ge stora skador i plantskola. Sjukdomen sprids från nedfallna blad på marken. Symptomen är observerbara under juli-okt.

SKADEBILD På blad bildas oregelbundet formade nekrotiska fläckar, ofta med skarpt gul rand. Även bladskäften angrips.

BIOLOGI Svampen övervintra på nedfallna blad. På våren smittas unga blad med sporer från svarta klotrunda fruktkroppar som ligger inbäddade i de döda löven. I de nekrotiska fläckarna, som då bildas, finns små svarta sporhus (pyknidier). Dessa sprider genomskinliga konidier under sommarhalvåret och uppförökar upp svampen under gynnsamma klimatbetingelser.

ÅTGÄRD Vid angrepp bör man avlägsna angripna blad samt samla in och och forsla bort nedfallna löv.



Nekrotiska bladfläckar på hästkastanj.
Foto: Guy Svedelius

Skylt 11 – Växtskyddsstigen

Vill du veta mer?

Ring 040-41 55 95 och tryck in skyltens nummer.

MATERIAL Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen för Växtvetenskap. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltjfab.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.