

Olvonbagge

Pyrrhalta viburni

Denna skalbagge är allmän och gnager på blad både som larv och fullbildad. Värdeväxt är olvon.

SKADEBILD Larverna finns ofta i stort antal och orsakar den största skadan. De kan kaläta buskarna i maj-juni. Även de vuxna gnager på plantorna senare under sommaren.

BIOLOGI Efter parning på sensommaren gnager honan små fördjupningar i årsskotten. I varje grop lägger hon flera ägg, som täcks med sekret och gnagspån. Larverna kläcks i maj och äter glupskt i en dryg månad. De blir nära 10 mm långa och förpuppas sen i jorden. Ett par veckor senare kläcks de vuxna olvonbaggarna, som är ca 5-6 mm långa och matt gulbruna.

ÅTGÄRD Behandla nykläckta larver med växtvårdsmedel (mineralolja).



Överst: Larver och gnagskador av olvonbagge. Ovan: Äggsamling. Foto: Elisabeth Kärnestam

Skylt 16 – Växtskyddsstigen

Vill du veta mer?

Ring 040-41 55 95 och tryck in skyltens nummer.

MATERIAL Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU, Institutionen för Växtvetenskap. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltfak.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.