

# Buxbombladloppa

## *Psylla buxi*

Bladloppor suger växtsaft och utsöndrar honungsdagg. Vuxna bladloppor är ca 2 mm långa, ljusgröna och vingade. Andra arter av bladloppor angriper t.ex. morot, hagtorn, päron och äpple.

**SKADEBILD** På buxbom blir toppskottens blad kraftigt kupade, p.g.a. toxiska ämnen i bladloppornas saliv, och längdtillväxten hämmas. Dessa sympton syns året runt.

**BIOLOGI** Ägg läggs på skotten och kläcks på våren. Ungstadierna (nymferna) är 1–2 mm, ljusgröna, platta och oftast stillasittande. De syns i maj–juni. Nymferna utsöndrar skyddande vaxsekret, som ser ut som vita tussar. I juni–juli är bladloppan fullbildad.

**ÅTGÄRD** Behandla med mineralolja.



Överst: Angrepp av buxbombladloppa, friskt skott i mitten.  
Ovan: Bladloppenympf.  
Foto: Elisabeth Kärnestam

**Skylt 18 – Växtskyddsstigen**

Vill du veta mer?

**Ring 040-41 55 95** och tryck in skyltens nummer.

**MATERIAL** Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU, Institutionen för Växtvetenskap. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltfak.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.