

# Pungsjuka på slån

## *Taphrina pruni*

Svampsjukdomen angriper även plommon, aprikos och hägg.

**SKADEBILD** Angripna frukter blir deformerade och kärnfria. De blir långsträckta, platta och krökta och kan sitta kvar året om. Ofta sitter både sjuka och friska bär på samma kvist.

**BIOLOGI** Svampen tillhör sporsäckssvamparna. Den övervintrar med hjälpa av askosporer eller tjockväggiga konidier på knoppar och kvistar. På våren sprids sporer till unga vävnader med vinden. Mycelet som växer mellan cellerna inducerar extrem celldelning som leder till missbildning av frukterna.

**ÅTGÄRD** Angripna frukter och svårt angripna kvistar ska destrueras.



Deformerade bär av slån angripna av pungsjuka. Foto: Guy Svedelius

**Skylt 3 – Växtskyddsstigen**

Vill du veta mer?

**Ring 040-41 55 95** och tryck in skyltens nummer.

**MATERIAL** Framtaget av Guy Svedelius, SLU, Institutionen för Växtvetenskap. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltjfab.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.