

Rosenstrit

Edwardsiana rosae

Stritar suger växtsaft både som nymfer och vuxna. Rosenstriten är polyfag och angriper även andra växter, såsom jordgubbar, hallon, körsbär och äpple. Stritarna är observerbara under maj-sept.

SKADEBILD Bladen blir vitprickiga, torkar in och faller av. Främst angrips klätter- och buskrosor, eftersom de beskärs sparsamt.

BIOLOGI På hösten läggs äggen i barken på unga skott, som blir lite knottriga. Nymforna är vitaktiga och sitter på bladens undersida. Vuxna rosenstritar är ca 3 mm långa, ljusgröna och vingade.

ÅTGÄRD Beskärning. Spruta med växtvårdsmedel eller pyretrum mot nymforna.



Överst: Begynnande angrepp av rosenstrit. Ovan: Nymf med vinganlag.
Foto: Elisabeth Kärnestam

Skylt 40 – Växtskyddsstigen

Vill du veta mer?

Ring 040-41 55 95 och tryck in skyltens nummer.

MATERIAL Framtaget av Elisabeth Kärnestam, SLU, Institutionen för Växtvetenskap. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltfak.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.