

Syrenmal

Gracillaria syringella

Angriper främst syren, men även benved, Deutzia och liguster.

SKADEBILD Stora, bruna blåsminor, ofta vid bladspetsen, med flera larver i. De rullar in bladet vid den torkande minan. Kan förväxlas med fysiogen skada, (brännskada).

BIOLOGI Fjärilen kläcks i början av juni. Äggen läggs på bladundersidan, 5-10 st tillsammans. Efter ca 4 veckors ätande faller larverna till marken, spinner en kokong och förpuppar sig. Övervintrar som puppa i jorden. Vanligen två generationer per år.

ÅTGÄRD Bortplockning av angripna blad. Eventuellt kan Bionim ha effekt mot unga larver.



Överst: Blåsmina. Foto: E. Kärnestam
Ovan: Vuxen syrenmal. Foto: S. Kalt

Skylt 67 – Växtskyddsstigen
För uppläsning av skylten
ring 040-41 55 95 och
tryck in skyltens nummer.

MATERIAL Framtaget av Elisabeth Kärnestam, LTJ-fakultet, SLU, Kompetensgrupp Växtskyddsbiologi. Växtskyddsstigen har många stationer och en broschyr. Mer information hittar du vid Alnarps trädgårdslaboratorium, Växthusvägen 14, eller på vår hemsida: <http://trglab.ltjfak.slu.se>. Skyltarna sitter vid en växt där du sannolikt hittar den beskrivna skadegöraren under någon del av säsongen.