



## Spolmask- bekämpning

Magnus Göransson  
Veterinär  
Svenska Ägg




## Svenska Ägg

Medlemmar är: Äggproducenter  
Kläckerier  
Uppfödare  
Foderföretag  
Packerier



Att arbeta med områden som är strategiskt viktiga för den svenska äggindustrins konkurrenskraft



## Svenska Ägg arbetar med:

- Ekonomiska och Politiska frågor på nationell och EU-nivå
- Djurskydd och Djurhälsa
- Information om ägget och äggproduktion till konsumenter
- Utbildning och information till medlemmar, studenter och myndigheter
- Marknadsföring




## RÖGGÄRA

Vad står det här?  
Tävla här och vinn en surplatta!

www.svenskaagg.se












## Kontroll och behandling

### Smittskydd










## Rastgård

Hela rastgården skall betraktas som rent utrymme.



Handtvätt och byte av skyddskläder kan ske inne i huset, medan byte av skor eller skoskydd skall ske vid hygiengränsen.





## Tvätt

Desinfektion Chlorocresol  
GIMRA PARA-DES  
INTERKOKASK  
(KALK)

Anthelmintica  
Flubendazole  
VERMINATOR

Hälsokontroll spolmask

## Hälsokontroll Spolmask

- En stor del av besättningarna med frigående höns är spolmasksmittade.
- Andelen smittade besättningar har ökat under de senaste åren.
- Det är mycket svårt att eliminera smittan.
- Ett avmaskningspreparat (Verminator) är tillgängligt, med 0 dagars karens på ägg.

## Syfte

- Motverka smittspridning
- Begränsa smittrycket
- Minimera läkemedelsanvändningen
- Minimera resistensutvecklingen
- Öka kunskapen om spolmaskens spridningsvägar och effektiva saneringsmetoder
- Förhindra att ägg med spolmask kommer ut till konsumenterna

## Strategi

- Provtagning av ung- och värphöns.
- Avmaskning av spolmaskinfekterade flockar.
- Sanering vid påvisad spolmaskförekomst.
- Uppföljning av åtgärder med nya prover.
- Kartläggning av spolmaskförekomst

## Provtagning

**SVA** STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

**Träckundersökning höns – Hälsokontroll spolmask**  
OBS! En remiss per provtagen avdelning/djurutrymme

Insändare (enl. svar och faktura) E-post till:  
Gård/produktionsplats: SFS - Svenska Ägg  
Adress: Kundid: 16040  
Postadress: Kontaktperson: Magnus Göransson  
Telefon:  
E-post:

Prov från: (markera med kryss)

Unghöns <input type="checkbox"/> 4 träckprov/ledagst 3 veckor före leverans	Värphöns <input type="checkbox"/> 4 träckprov/ledagst 3 mån efter insättning	Avelshöns <input type="checkbox"/> 4 träckprov/ledagst 3 mån efter insättning
---	--	---

## Träckprov från värphöns/avelshöns




4st samlingsprov  
0,5-1dl/prov  
Ta provet spritt i djuravdelningen från sittpinnar, skrapor, spalt gödselband, ströbädd

Paketera i dubbla plastpåsar  
Vadderat kuvert och skicka till SVA  
OBS! Fyll i remissen noggrant



## Vad skall man göra om träckprovet blir positivt?



Viktigt att skilja på spolmask och blindtarmsmask. Det kan göras på olika sätt.

- På slakteriet
- Obduktion på laboratorie eller av besättningsveterinären
- Egen tarmöppning



## Avmaskning

### 2) Förbered lösning

- a) Fyll en behållare med vatten motsvarande 10-100 gånger den mängd Verminator som ska blandas (1-10 l vatten till 100 g Verminator)
- b) Krama Verminator-påsen några gånger före användning
- c) Tillsätt den beräknade mängden Verminator till vattnet
- d) Vispa med en visp för att uppnå en vit mjölkaktig homogen lösning (minst 3 minuter)







### 3) Behandla via dricksvattnet

Lösningen distribueras genom det vanliga vattenförsörjningssystemet (via behållare, tråg eller medicinblandare).

Det är viktigt att det medicinerade vattnet konsumeras inom 4 timmar och att behandlingen sker när vattenkonsumtionen förmodas vara som störst.

### 4) Rengör rör och behållare

Efter behandlingen ska behållare, tråg och rör nogga rengöras

