


Vad gör ett bra ensilage?




Carl Helander

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Götala

Forskningscentrum för nöt- och lammkött



Vilka djur studerar vi?



- Dräktiga tackor
- Digivande tackor
- Växande lamm
- Baggar (som modelldjur)

Skördetidpunkt

Påverkar skördetidpunkten:

- Foderintag
- Hull
- Lammtillväxt



Skördetidpunkt


Tackor och lamm fick:

- 1) Tidigt (2 Juni)
- 2) Normal (12 Juni)
- 3) Sent (21 Juni)



*Senare skördetidpunkt ger **lägre smältbarhet***

Ensilageintag



Ensilageintag


Smältbarhet



Ensilageintag



Hull



Hull


Smältbarhet




Ensilageintag



Hull



Lammen



Lammen


Smältbarhet



Ensilageintag



Hull



Tillväxt



Kraftf. intag



Slutsats

För maximal produktion:

- Hög smältbarhet
- ✓ Tidig skörd




Fullfoder


Tackor och lamm fick

- 1) Långt ensilage (35 cm) + 0.8 kg kraftf.
- 2) Hackat ensilage (1.8 cm) + 0.8 kg kraftf.
- 3) Hackat ensilage blandat med kraftf.


Ensilageintag




Hull



Lammtillväxt



Lönsamhet



Slutsatser

För maximal produktion

✓ Fullfoder med tidigt skördat ensilage

