



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap

Åkerböna till gris i konventionell och ekologisk produktion - egenskaper och användbarhet hos olika sorter

Stiftelsen Lantbruksforskning
2014-2016

Maria Neil, Emma Ivarsson
Inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU



Odlingen av åkerböna ökat under senare år
Åkerböna - proteinfoder till gris

Begränsningar:

1. Aminosyraprofil – lågt metionininnehåll
2. Antinutritionella substanser (ANS)
– proteashämmare, vicin och convicin, tanniner, ...
3. Proteininnehåll lägre än i t ex soja

Kringgås genom:

- (1, 3) Klok foderoptimering
- (2) Hantera ANS



Hantera ANS

- Växtförädla (raps, ärt, åkerböna)
- Värmebehandla (rost, expeller, ...)
- Separera (t ex skala)
- Späda ut – begränsa inblandning

- Ha koll!
Hålla isär partier,
följa upp resultat,
...





- Vitblommiga sorter förstahandsval för grisfoder, inget eller lågt innehåll tanniner
- Brokblommiga bättre i odling – avkastning, sjukdomsresistens
- Variation i ANS-innehåll mellan brokblommiga sorter?
- Skulle vissa brokblommiga sorter kunna användas i grisfoder?



Projektet, plan:

Lab-analys av sorts specifika prover



Välja ut en lovande och en mindre lovande brokblommig sort, samt en vitblommig



Utfodringsförsök tillväxtgrisar

3 foder med åkerböna, 1 foder med soja

med resp. utan tillsats av aminosyror
(konventionell resp. ekologisk produktion)





Projektet:

Prover från Sverigeförsöken 2013

– 112 prover av totalt 17 sorter!

Såväl konventionell som ekologisk serie, med avkastningsdata

Råanalys

Kondenserade tanniner

Vicin och convicin

Enzymatisk smältbarhet in vitro

– torrsustans (ts), organisk substans (os), råprotein (rp)

Aminosyror



Projektet:

Lab-resultat => **skillnader** mellan

- Odlingsystem
- Blomfärg
- Sort inom blomfärg


I ts	Odling		Blomfärg		Variationsvidd	
	Konv	Eko	Brok	Vit	sort (min-max)	
			Brok	Vit	Brok	Vit
Råprotein, %	31,1	30,7	31,0	30,8	30-33	29-34
In vitro "smältbart" OS, %	64	61	60	65	56-62	63-67
RP, %	30	29	29	30	27-31	28-33
Kondenserade tanniner, g/kg	3,25	3,45	6,47	0,23	5,6-7,4	0,0-0,6

(**Feta** siffror= signifikant effekt)

Sorter i konventionell odling

Innehåll kondenserade tanniner, g/kg


Polymerisationsgrad, %*10



Sorter i ekologisk odling

Innehåll kondenserade tanniner, g/kg

Polymerisationsgrad, %*10





Projektet:

Analysresultat + sortprovningensdata =>
hektarskörd "smältbar" OS och RP


- **högre** i konventionell än i ekologisk odling
- **lika hög** hos brok- som hos vitblommiga



Per ha	Odling		Blomfärg		Variationsvidd sort (min-max)	
	Konv	Eko	Brok	Vit	Brok	Vit
In vitro "smältbart"						
OS, ton	2,90	1,99	2,40	2,46	1,7-3,2	1,7-3,1
RP, ton	1,37	0,94	1,16	1,13	0,9-1,4	0,8-1,4

Sorter i konventionell odling


Skörd ts samt "smältbar" OS och RP kg per ha



Sorter i ekologisk odling

Skörd ts samt "smältbar" OS och RP kg per ha

(endast 1 prov)





Sorter till foderförsöket?

- Användning
 - är RP-innehåll begränsande?
 - är aminosyraprofil begränsande?
 - är tanniner begränsande?
- Odling
 - kvalitet eller kvantitet?
- Odlingssystemet



Sorter til vårt foderforsök?

Överraskning, danska resultat!

Liknande upplägg

- Tillväxtgrisar
- Två brokblommiga, en vitblommig
- Sojakontroll

- ✓ Foderintag - inget problem
- ✓ Tillväxt - inget problem
- ✓ Mindre diarré med åkerböna

Fuego en av sorterna DK

Fuego mätare i sortprovning S



Videncenter for
Svineproduktion

Støttet af:



HESTEBØNNER TIL SMÅGRISE ØGER PRODUKTIVITETEN

MEDDELELSE NR. 1002

Smågrisefoder med 25 % hestebønner gav signifikant højere produktionsværdi for smågrise i intervallet 9-30 kg sammenlignet med kontrolblanding. Grise, der blev fodret med hestebønner af sorten Espresso, blev behandlet i signifikant færre dage for diarré.

INSTITUTION: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, DEN RULLENDE AFPRØVNING

FORFATTER: SØNKE MØLLER

UDGIVET: 15. APRIL 2014

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring

Sammendrag

Smågrise i vægtintervallet 9-30 kg klarede sig fint på foder iblandet tanninrige hestebønner af sorterne Fuego og Espresso. Iblanding af 25 pct. hestebønner af de to nævnte sorter forbedrede produktionsværdien med 8 procentpoint i forhold til en sojabaseret blanding og med 5 procentpoint i forhold til en foderblanding med 25 pct. af den tanninfrie sort Columbo. De nævnte forskelle var statistisk sikre. Fodring med hestebønner af sorten Espresso reducerede endvidere forekomsten af diarré statistisk sikkert i forhold til fodring med den sojabaserede foderblanding.



Sorter till foderförsöket

- Vitblommig
 - **Gloria**
- Brokblommig
 - **Julia** (lovande)
 - **Fuego** (mindre lovande)

% i ts	Rp	Smb os	Smb rp	Tannin (g/kg)
Gloria	34,4	67,1	33,6	0
Julia	32,6	62,9	30,6	5,7
Fuego	30,4	59,0	28,4	6,4



Foder till försök

- Kontroll
- Gloria – 20%
- Julia – 10% (= kontroll + Julia 20%)
- Julia – 20%
- Fuego – 10% (= kontroll + Fuego 20%)
- Fuego – 20%

Del 1 – aminosyror tillsätts

Del 2 – aminosyror tillsätts ej



Foder till försök

Del 1: Åkerböna
i st f spannmål, soja och potatisprotein

9,35 MJ NE

130 g sis rp/MJ NE

1,04 g sis lys/MJ NE

0,31 g sis met/MJ NE



Del 2: Åkerböna (och rapsfrö)
i st f spannmål och soja

9,25-9,5 MJ NE

150-165 g sis rp/MJ NE

0,9 g sis lys/MJ NE

0,27-0,32 g sis met/MJ NE

Grisar till försök

720 avvänjningsgrisar (Y*H)

6 boxar per behandling, 10 grisar per box

Split litter

5-9 veckors ålder

Fri tillgång pelletterat foder i automat



Resultat från 5 boxar per behandling i del 1

	Kontroll	Gloria	Julia10	Julia20	Fuego10	Fuego20	SEM
7-veckorsvikt, kg	15,8	16,3	16,2	16,1	15,8	15,8	0,80
9-veckorsvikt, kg	25,1	25,8	26,4	26,5	25,6	25,2	0,57
Daglig tillväxt, g	501	520	549	542	516	507	13,1
Dagligt foderintag, g	834	843	902	851	842	808	19,8
FCR, g foder per g tillväxt	1,67 ^b	1,61 ^{ab}	1,65 ^b	1,55 ^a	1,63 ^b	1,61 ^{ab}	0,023



Diskussion

- Sänkt smb rp och aa (Jansman et al., 1993)
- 30% inblandning => lägre smb rp men bibehållen tillväxt vid ~0,6 g tannin/kg foder (Flis et al., 1999)
- 25% inblandning brokblommig => högre tillväxt och lägre diarrefrekvens (Møller, 2014)



Preliminär konklusion

Om aminosyraprofilen kompletterats kan upp till 20% vit- eller brokblommig åkerböna ingå i foder till tillväxtgrisar - med gott resultat.





**Tack för att du
lyssnat!**

maria.neil@slu.se

Projektet finansieras av
Stiftelsen Lantbruksforskning

