

Veckans växt v. 14 2011

Hästkastanj del II (*Aesculus hippocastanum*)

Prisförteckning.		17	
	Pr. st.		Pr. st.
<i>Aesculus</i> , hästkastanje, <i>Hippocastanaceae</i> .		<i>Amygdalus</i> , <i>persica</i> fol. atro-purpurea	2,00.
— <i>Hippocastanum</i> , pr 100 st. 40,00—50,00	0,50.	Nyhet, med vackra blodröda frukter och blad.	
— — <i>Euro pleno</i>	1,00.	— <i>persica</i> f. <i>pleno</i> se <i>Prunus japonica</i> .	
— — <i>macrostachya</i> , N. Amerika	0,50.	<i>Amygdalopsis</i> Lindley, se <i>Prunus triloba</i> .	
— — <i>marylandica</i>	1,00.	<i>Aralia</i> , <i>araliaceae</i> .	
— — <i>neglecta</i> (Hava) N. Amerika	1,00.	— <i>japonica</i> decorativ bladväxt.	1,00.
— — <i>rubicunda</i>	1,00.	— <i>spicata</i>	1,00.
<i>Allanthus</i> , Guds-träd. <i>Xanthoxylaceae</i> .		<i>Aristolochia</i> , <i>aristolochiaceae</i> .	
— <i>glandulosus</i> , Japan, pr 100 st. 40,00	0,50.	— <i>Sipho</i>	1,00 à 1,50.
<i>Akebia</i> , <i>Berberidaceae</i> .		— <i>tomentosa</i>	0,75.
— <i>quinata</i> , Japan, slingerväxt	0,75.	Stora och mycket vackra blad; utmärkt slingerväxt.	
<i>Alnus</i> , Al. <i>Betulaceae</i> .		<i>Artemisia</i> , Åbrodd. <i>Compositae</i> .	
— <i>cordifolia</i>	0,25.	— <i>Abrotanum</i> , pr 10 st. 2,00	0,25.
— <i>glutinosa</i> , pr 100 st. 18,00	0,20.	<i>Astragalus</i> , Alprefta. <i>Ranunculaceae</i> .	
— — <i>imperialis</i>	1,00 à 1,50.	— <i>alpina</i> , blå bl.	0,25.
— — <i>lacinolata</i>	1,00 à 1,50.	— — <i>alba</i> , hvita bl.	0,25.
— — <i>incana oxycanthifolia</i>	1,00.	<i>Azalea</i> , <i>Ericaceae</i> .	
— <i>Oregona</i> , ny	0,50.	— <i>amurensis</i> , China, småplantor	1,00.
<i>Amelanchier</i> , Bärnispel. <i>Rosaceae</i> .		— <i>pontica</i> , Kaukasus	1,00.
— <i>Botryapium</i>	0,25.	<i>Berberis</i> , Sörtörna. <i>Berberidaceae</i> .	
— <i>ovata</i>	0,25.	— <i>retinacantha</i> , Chili mörkgul	0,25.
Värdefulla buskar, dessa blomma tidigt på våren.		— <i>canadensis</i> , Kanada, gul	0,25.
<i>Amorpha</i> , <i>Papilionaceae</i> .		— <i>cretica</i>	0,25.
— <i>fruticosa</i>	0,25.	— <i>Darwini</i> , Chili	1,00.
— — <i>Levesii</i>	0,25.	— <i>fulva</i>	0,75.
— <i>glabra</i>	0,25.	— <i>Keigthii</i>	0,75.
Frambringar i Juli—Augusti sina egendomliga bruna blommor.		— <i>Neobertii</i> , (Banan)	0,75.
<i>Ampelopsis</i> , Jangfruvin, <i>Ampelidaceae</i> .		— <i>vulgaris</i> , pr 100 st. 20,00	0,25.
— <i>hederacea</i> , pr 10 st. 2,00	0,25.	— — fol. <i>atropurpurea</i> , pr 10 st. 3,00	0,25.
— <i>hirta</i>	0,25.	<i>Betula</i> , Björk. <i>Betulaceae</i> .	
— <i>elegans</i>	0,25.	— <i>alba</i> , pr 100 st. 18,00	0,20.
— <i>quinquefolia</i> fol. varg.	0,50.	— — fol. <i>atropurpurea</i>	3,00.
— <i>speciosa nova</i>	0,50.	Genom de vackra blodröda bladen kommer denna nya af-art att i 1885 med blodböken, derigenom att dess växtsätt är elegantare.	
<i>A. hederacea</i> är bekant vid, i kort tid att kunna täcka höga espaljer, såsom lifslärlar o. s. v.		— — <i>alba</i> fol. <i>lacinolata</i> 2,00 à 3,00.	
<i>Amygdalus</i> , Mandel. <i>Dru-paceae</i> .		— <i>americana</i> , 2-åriga plantor	0,50.
— <i>nana</i>	0,25.		

Många sorter och varianter av hästkastanj kom under mitten av-1800 talet. Utbudet i Alnarps plantskola under 1878-1879 visar att förutom vanlig hästkastanj fanns det också att köpa 'Floro plen', 'Macrostachya', 'Marylandica', 'Neglecta' och 'Rubicunda'. 'Floro plena' syn. 'Baumannii' kom redan 1820 och finns fortfarande i handeln.

Några andra exempel på *Aesculus* med variation i bladfärg, blomfärg och bladform har sorterna 'Memmingeri', 'Lacinatum' och 'Briotii'. *Aesculus hippocastanum*'Memmingeri' är en hästkastanj med vackert gulaktiga blad. Ursprunget är okänt men det är känt att den fanns i odling före 1855. Den är namngiven efter Gustav Memminger of Verdum.

Aesculus hippocastanum 'Lacinatum' syn. 'Lacinata' flikbladig hästkastanj har sitt ursprung i Frankrike från år 1844. Den har fint flikiga blad som ger en vacker ljussläppning genom kronan.

Den mörkröda hästkastanjen *Aesculus x carnea* 'Briotii' skiljer sig i bladform från

den vanliga hästkastanjen då bladen är smalare och mer spetsiga jämfört med *hippocastanum*. 'Briotii' fanns i odling redan 1858 i Versailles och finns fortfarande i handeln. Den är ett vackert solitärträd, med mörkröda blommor i maj till juni. 'Briotii' är härdig i zon I-III.



Aesculus hippocastanum 'Memmingeri'



Aesculus hippocastanum 'Memmingeri'

Aesculus hippocastanum 'Lacinatum'



Aesculus hippocastanum 'Lacinatum'





Aesculus x carnea 'Briotii'

Text och foto: Katarina Wedelsbäck Bladh, Träd- och buskuproppet