

Åkerböna, vitblommig

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	87	Ca	g/kg Ts	1,7
Aska	g/kg Ts	41	P	g/kg Ts	6,8
Råprotein	g/kg Ts	311	Mg	g/kg Ts	1,8
Råfett	g/kg Ts	13	K	g/kg Ts	16
Växttråd	g/kg Ts	87	Na	g/kg Ts	0,3
NDF	g/kg Ts	160	Mn	mg/kg Ts	22
ADF	g/kg Ts	106	Se	mg/kg Ts	0,02
Stärkelse	g/kg Ts	433	Cu	mg/kg Ts	15
Socker	g/kg Ts	43	Zn	mg/kg Ts	53

NEv	MJ/kg Ts	10,7	Smältbarhet för fosfor		
NEs	MJ/kg Ts	10,9	Mjöl	%	37
OEsv	MJ/kg Ts	13,8	Pellets	%	37

Smältbarhet,%

Lysin	g/kg Ts	20	sisLys	g/kg Ts	17,6	88
Treonin	g/kg Ts	11,1	sisTreo	g/kg Ts	9,2	83
Metionin	g/kg Ts	2,2	sisMet	g/kg Ts	1,8	83
Cystin	g/kg Ts	4,0	sisCys	g/kg Ts	3,0	76
Met+Cys	g/kg Ts	6,2	sisMet+Cys	g/kg Ts	4,9	79
Tryptofan	g/kg Ts	2,6	sisTry	g/kg Ts	2,1	81
Valin	g/kg Ts	14,1	sisVal	g/kg Ts	11,6	82
			sisRp	g/kg Ts	261	84

Källor	Råanalys:	EvaPig version 1.0.2.0
	Mineralämnen:	www.infosvin.dk/Haandbog/Foder/Raavare , 15.07.2008
	Näringsvärden:	Beräknade från EvaPig version 1.0.2.0, Åkerböna Koefficienten för sisRp från Sauvont et al. 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsugger	se kommentar
	Digivande sugger	se kommentar
	Smågrisar	20
	Slaktgrisar	20

Kommentarer

Äldre sorter av brokblommiga åkerböner rekommenderas endast i begränsad omfattning till växande grisar. Moderna vitblommiga sorter har däremot visat sig vara utmärkta fodermedel till växande grisar. Dokumentationen vad gäller användbarhet till sugger är dock mycket begränsad och rekommendationerna bygger fortfarande på försök med gamla sorter. Det bör inte innebära några problem med 10% i foder till sugger, men noggrann produktionsuppföljning och utvärdering rekommenderas.