

Ärter

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	87	Ca	g/kg Ts	0,9
Aska	g/kg Ts	35	P	g/kg Ts	4,6
Råprotein	g/kg Ts	239	Mg	g/kg Ts	1,3
Råfett	g/kg Ts	12	K	g/kg Ts	12
Växttråd	g/kg Ts	60	Na	g/kg Ts	0,2
NDF	g/kg Ts	139	Mn	mg/kg Ts	16
ADF	g/kg Ts	69	Se	mg/kg Ts	
Stärkelse	g/kg Ts	516	Cu	mg/kg Ts	6,7
Socker	g/kg Ts	45	Zn	mg/kg Ts	39

NEv	MJ/kg Ts	11,2	Smältbarhet för fosfor		
NEs	MJ/kg Ts	11,5	Mjöl	%	47
OEsv	MJ/kg Ts	14,7	Pellets	%	47

Smältbarhet,%

Lysin	g/kg Ts	17,3	sisLys	g/kg Ts	14,4	83
Treonin	g/kg Ts	9,1	sisTreo	g/kg Ts	6,9	76
Metionin	g/kg Ts	2,3	sisMet	g/kg Ts	1,8	80
Cystin	g/kg Ts	3,2	sisCys	g/kg Ts	2,3	72
Met+Cys	g/kg Ts	5,5	sisMet+Cys	g/kg Ts	4,1	75
Tryptofan	g/kg Ts	2,1	sisTry	g/kg Ts	1,5	73
Valin	g/kg Ts	11,3	sisVal	g/kg Ts	8,7	77
			sisRp	g/kg Ts	191	80

Källor	Råanalys:	EvaPig version 1.0.2.0
	Mineralämnen:	www.infosvin.dk/Haandbog/Foder/Raavare , 24.11.2006
	Näringsvärden:	Beräknade från EvaPig version 1.0.2.0, Ärter Koefficienten för sisRp från Sauvont et al. 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	10
	Digivande suggor	10
	Smågrisar	20
	Slaktgrisar	20

Kommentarer

Äldre sorter av brokblommiga ärter rekommenderades endast i begränsad omfattning till grisar. Moderna vitblommiga sorter har däremot visat sig vara bra fodermedel till grisar. Ärter till suggor har endast provats med lägre inblandningar och eftersom äldre brokblommiga sorter visats ha negativa effekter begränsas rekommendationen till 10%.