

Betfiber, omelasserad

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	89	Ca	g/kg Ts	11,4	
Aska	g/kg Ts	77	P	g/kg Ts	1,0	
Råprotein	g/kg Ts	91	Mg	g/kg Ts	2,3	
Råfett	g/kg Ts	10	K	g/kg Ts	3,7	
Växttråd	g/kg Ts	194	Na	g/kg Ts	0,6	
NDF	g/kg Ts	454	Mn	mg/kg Ts	54	
ADF	g/kg Ts	231	Se	mg/kg Ts	0,1	
Stärkelse	g/kg Ts	0	Cu	mg/kg Ts	6,9	
Socker	g/kg Ts	75	Zn	mg/kg Ts	16	
NEv	MJ/kg Ts	6,9	Smältbarhet för fosfor			
NEs	MJ/kg Ts	8,0	Mjöl	%	20	
OEsv	MJ/kg Ts	11,6	Pellets	%	20	
						Smältbarhet,%
Lysin	g/kg Ts	7,2	sisLys	g/kg Ts	3,6	50
Treonin	g/kg Ts	4,5	sisTreo	g/kg Ts	1,4	31
Metionin	g/kg Ts	1,7	sisMet	g/kg Ts	1,0	61
Cystin	g/kg Ts	1,2	sisCys	g/kg Ts	0,3	22
Met+Cys	g/kg Ts	2,9	sisMet+Cys	g/kg Ts	1,2	43
Tryptofan	g/kg Ts	0,9	sisTry	g/kg Ts	0,4	41
Valin	g/kg Ts	6,2	sisVal	g/kg Ts	2,6	42
			sisRp	g/kg Ts	48	53

Källor Råanalys: EvaPig version 1.0.2.0
Mineralämnen: www.infosvin.dk/Haandbog/Foder/Raavare, 24.11.2006
Näringsvärden: Beräknade i EvaPig version 1.0.2.0; Betfiber, torkad
Koefficienten för sisRp från Sauvont et al. 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	50
	Digivande suggor	10
	Smågrisar	5
	Slaktgrisar	15

Kommentarer

Betfiber innehåller stor andel lösliga fiber med specifikt positiva egenskaper i tarmen. Den används därför ofta i foder till smågrisar för att minska risken för diarré och till högdräktiga suggor för att minska frekvensen av difeber. Betfiber kan också användas i sinsuggfoder för att reducera energiintaget. Foder med 40-60% betfiber kan utfodras i fri tillgång och ger dessutom lugna djur. Betfiber binder mycket vatten och försämrar pumpbarheten av blöta foder.