

Fetter, animala

Senast ändrad 090727

Ts	% av vara	100	Ca	g/kg Ts	0
Aska	g/kg Ts	0	P	g/kg Ts	0
Råprotein	g/kg Ts	0	Mg	g/kg Ts	0
Råfett	g/kg Ts	1000	K	g/kg Ts	0
Växttråd	g/kg Ts	0	Na	g/kg Ts	0
NDF	g/kg Ts	0	Mn	mg/kg Ts	0
ADF	g/kg Ts	0	Se	mg/kg Ts	0
Stärkelse	g/kg Ts	0	Cu	mg/kg Ts	0
Socker	g/kg Ts	0	Zn	mg/kg Ts	0

NEv	MJ/kg Ts	29,8	Smältbarhet för fosfor		
NEs	MJ/kg Ts	29,8	Mjöl	%	0
OEsv	MJ/kg Ts	34,0	Pellets	%	0

Lysin	g/kg Ts	0	sisLys	g/kg Ts	
Treonin	g/kg Ts	0	sisTreo	g/kg Ts	
Metionin	g/kg Ts	0	sisMet	g/kg Ts	
Cystin	g/kg Ts	0	sisCys	g/kg Ts	
Met+Cys	g/kg Ts	0	sisMet+Cys	g/kg Ts	
Tryptofan	g/kg Ts	0	sisTry	g/kg Ts	
Valin	g/kg Ts	0	sisVal	g/kg Ts	
			sisRp	g/kg Ts	

Källor	Råanalys:	EvaPig version 1.0.2.0
	Mineralämnen:	
	Näringsvärden:	Beräknade i EvaPig version 1.0.2.0; Fett, gris

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	15
	Digivande suggor	15
	Smågrisar	20
	Slaktgrisar	15

Kommentarer

Fodrets fettsyror påverkar sammansättningen av grisens fett. En stor andel omättat fett i fodret ger lösare fett hos grisen med ett högre jodtal.