

Linfrö

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	91	Ca	g/kg Ts	2,6
Aska	g/kg Ts	38	P	g/kg Ts	5,7
Råprotein	g/kg Ts	227	Mg	g/kg Ts	4,1
Råfett	g/kg Ts	437	K	g/kg Ts	8,9
Växttråd	g/kg Ts	80	Na	g/kg Ts	0,4
NDF	g/kg Ts	203	Mn	mg/kg Ts	30
ADF	g/kg Ts	83	Se	mg/kg Ts	0,4
Stärkelse	g/kg Ts	0	Cu	mg/kg Ts	14
Socker	g/kg Ts	29	Zn	mg/kg Ts	50

NEv	MJ/kg Ts	17,3	Smältbarhet för fosfor		
NEs	MJ/kg Ts	17,5	Mjöl	%	20
OEsv	MJ/kg Ts	21,3	Pellets	%	20

Smältbarhet,%

Lysin	g/kg Ts	9,8	sisLys	g/kg Ts	7,5	77
Treonin	g/kg Ts	11,6	sisTreo	g/kg Ts	8,8	76
Metionin	g/kg Ts	4,8	sisMet	g/kg Ts	4,1	85
Cystin	g/kg Ts	4,9	sisCys	g/kg Ts	3,6	73
Met+Cys	g/kg Ts	9,8	sisMet+Cys	g/kg Ts	7,7	79
Tryptofan	g/kg Ts	4,3	sisTry	g/kg Ts	3,3	77
Valin	g/kg Ts	13,3	sisVal	g/kg Ts	10,3	78
			sisRp	g/kg Ts	193	85

Källor	Råanalys:	EvaPig ver. 1.0.2.0
	Mineralämnen:	www.infosvin.dk/Haandbog/Foder/Raavare , 24.11.2006
	Näringsvärden:	Beräknade i EvaPig ver. 1.0.2.0; Linfrö, extruderat Koefficienten för sisRp är fekal från Sauvant et al. 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	8
	Digivande suggor	8
	Smågrisar	8
	Slaktgrisar	8

Kommentarer

Linfrö innehåller varierande mängder av linamarin som under inverkan av linamaras, som också finns i fröet, ombildas till blåsyra i tarmen. Generell inblandning i foder rekommenderas därför vara relativt låg. Om högre mängd används skall man vara uppmärksam på förändringar i produktionsresultat.

Linolja innehåller mycket omega3-fettsyra.