

Lusernmjöl

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	91	Ca	g/kg Ts	22,4
Aska	g/kg Ts	117	P	g/kg Ts	2,7
Råprotein	g/kg Ts	185	Mg	g/kg Ts	1,8
Råfett	g/kg Ts	28	K	g/kg Ts	26,1
Växttråd	g/kg Ts	283	Na	g/kg Ts	0,2
NDF	g/kg Ts	461	Mn	mg/kg Ts	62
ADF	g/kg Ts	326	Se	mg/kg Ts	0,28
Stärkelse	g/kg Ts	0	Cu	mg/kg Ts	5,6
Socker	g/kg Ts	46	Zn	mg/kg Ts	21

NEv	MJ/kg Ts	4,1	Smältbarhet för fosfor		
NEs	MJ/kg Ts	4,8	Mjöl	%	20
OEsv	MJ/kg Ts	7,1	Pellets	%	20

Smältbarhet,%

Lysin	g/kg Ts	8,5	sisLys	g/kg Ts	5,3	62
Treonin	g/kg Ts	7,5	sisTreo	g/kg Ts	5,0	66
Metionin	g/kg Ts	2,7	sisMet	g/kg Ts	2,1	76
Cystin	g/kg Ts	2,5	sisCys	g/kg Ts	0,9	37
Met+Cys	g/kg Ts	5,2	sisMet+Cys	g/kg Ts	3,0	58
Tryptofan	g/kg Ts	2,6	sisTry	g/kg Ts	1,2	45
Valin	g/kg Ts	10,1	sisVal	g/kg Ts	7,0	69
			sisRp	g/kg Ts	79	43

Källor	Råanalys:	EvaPig ver. 1.0.2.0
	Mineralämnen:	Sauvant et al. 2004
	Näringsvärden:	Beräknade i EvaPig ver. 1.0.2.0; Lusern, torkad, 18-19% Rp i Ts
		Koefficienten för sisRp är fekal från Sauvant et al. 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	15
	Digivande suggor	5
	Smågrisar	5
	Slaktgrisar	5

Kommentarer

Näringsvärdet påverkas av växtens utvecklingsstadie och kan därför variera mycket mellan partier. Lågt innehåll av energi kan minska grisarnas foderintag.