

Sojamjöl, 43% Rp i vara

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	88	Ca	g/kg Ts	3,9	
Aska	g/kg Ts	74	P	g/kg Ts	7,1	
Råprotein	g/kg Ts	494	Mg	g/kg Ts	3,3	
Råfett	g/kg Ts	19	K	g/kg Ts	24	
Växttråd	g/kg Ts	70	Na	g/kg Ts	0,05	
NDF	g/kg Ts	142	Mn	mg/kg Ts	40	
ADF	g/kg Ts	85	Se	mg/kg Ts		
Stärkelse	g/kg Ts	0	Cu	mg/kg Ts		
Socker	g/kg Ts	97	Zn	mg/kg Ts		
NEv	MJ/kg Ts	9,2	Smältbarhet för fosfor			
NEs	MJ/kg Ts	9,9	Mjöl	%	20	
OEsv	MJ/kg Ts	14,5	Pellets	%	20	
Smältbarhet,%						
Lysin	g/kg Ts	30,3	sisLys	g/kg Ts	27,3	90
Treonin	g/kg Ts	19,3	sisTreo	g/kg Ts	16,6	87
Metionin	g/kg Ts	7,1	sisMet	g/kg Ts	6,5	92
Cystin	g/kg Ts	7,4	sisCys	g/kg Ts	6,4	86
Met+Cys	g/kg Ts	14,4	sisMet+Cys	g/kg Ts	12,8	89
Tryptofan	g/kg Ts	6,4	sisTry	g/kg Ts	5,7	89
Valin	g/kg Ts	23,8	sisVal	g/kg Ts	20,9	88
			sisRp	g/kg Ts	430	87

Källor Råanalys: EvaPig ver. 1.0.2.0
 Mineralämnen: Sauvant et.al 2004
 Näringsvärden: Beräknade i EvaPig ver. 1.0.2.0; Sojamjöl
 Koefficienten för sisRp är från Sauvant et al. 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	30
	Digivande suggor	30
	Smågrisar	20
	Slaktgrisar	30

Kommentarer

Sojaböna innehåller substanser som minskar proteinutbytet i tarmen. Vid tillverkning av sojamjöl sker en uppvärmning som förstör dessa ANF. Kvar finns fortfarande ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner i tarmen hos nyavvanda grisar. Därför rekommenderas ingen eller låg inblandning i foder till denna kategori av djur.