

Sojamjöl, 45% Rp i vara

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	88	Ca	g/kg Ts	3,9	
Aska	g/kg Ts	73	P	g/kg Ts	7,1	
Råprotein	g/kg Ts	516	Mg	g/kg Ts	3,3	
Råfett	g/kg Ts	21	K	g/kg Ts	24	
Växttråd	g/kg Ts	68	Na	g/kg Ts	0,3	
NDF	g/kg Ts	139	Mn	mg/kg Ts	43	
ADF	g/kg Ts	83	Se	mg/kg Ts	0,22	
Stärkelse	g/kg Ts	0	Cu	mg/kg Ts	21	
Socker	g/kg Ts	94	Zn	mg/kg Ts	53	
NEv	MJ/kg Ts	9,3	Smältbarhet för fosfor			
NEs	MJ/kg Ts	9,9	Mjöl	%	32	
OEsv	MJ/kg Ts	14,6	Pellets	%	32	
Smältbarhet,%						
Lysin	g/kg Ts	31,6	sisLys	g/kg Ts	28,4	90
Treonin	g/kg Ts	20,1	sisTreo	g/kg Ts	17,5	87
Metionin	g/kg Ts	7,3	sisMet	g/kg Ts	6,7	92
Cystin	g/kg Ts	7,6	sisCys	g/kg Ts	6,5	86
Met+Cys	g/kg Ts	14,9	sisMet+Cys	g/kg Ts	13,3	89
Tryptofan	g/kg Ts	6,7	sisTry	g/kg Ts	6,0	89
Valin	g/kg Ts	24,9	sisVal	g/kg Ts	21,9	88
			sisRp	g/kg Ts	454	88

Källor Råanalys: EvaPig ver. 1.0.2.0
 Mineralämnen: Sauvant et.al 2004
 Näringsvärden: Beräknade i EvaPig ver. 1.0.2.0; Sojamjöl
 Koefficienten för sisRp är från Sauvant et al. 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	30
	Digivande suggor	30
	Smågrisar	20
	Slaktgrisar	30

Kommentarer

Sojaböna innehåller substanser som minskar proteinutbytet i tarmen. Vid tillverkning av sojamjöl sker en uppvärmning som förstör dessa ANF. Kvar finns fortfarande ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner i tarmen hos nyavvanda grisar. Därför rekommenderas ingen eller låg inblandning i foder till denna kategori av djur.