

Sojamjöl, 47%Rp i vara

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	88	Ca	g/kg Ts	4,0	
Aska	g/kg Ts	72	P	g/kg Ts	7,7	
Råprotein	g/kg Ts	539	Mg	g/kg Ts	3,6	
Råfett	g/kg Ts	17	K	g/kg Ts	25	
Växttråd	g/kg Ts	44	Na	g/kg Ts	0,5	
NDF	g/kg Ts	102	Mn	mg/kg Ts	54	
ADF	g/kg Ts	55	Se	mg/kg Ts	0,19	
Stärkelse	g/kg Ts	0	Cu	mg/kg Ts	18	
Socker	g/kg Ts	105	Zn	mg/kg Ts	55	
NEv	MJ/kg Ts	9,6	Smältbarhet för fosfor			
NEs	MJ/kg Ts	10,1	Mjöl	%	32	
OEsv	MJ/kg Ts	14,7	Pellets	%	32	
						Smältbarhet,%
Lysin	g/kg Ts	32,9	sisLys	g/kg Ts	30,3	92
Treonin	g/kg Ts	20,9	sisTreo	g/kg Ts	18,6	89
Metionin	g/kg Ts	7,5	sisMet	g/kg Ts	7,0	93
Cystin	g/kg Ts	7,8	sisCys	g/kg Ts	6,9	89
Met+Cys	g/kg Ts	15,4	sisMet+Cys	g/kg Ts	14	91
Tryptofan	g/kg Ts	7,0	sisTry	g/kg Ts	6,4	91
Valin	g/kg Ts	26	sisVal	g/kg Ts	23,4	90
			sisRp	g/kg Ts	485	90

Källor Råanalys: EvaPig ver. 1.0.2.0
 Mineralämnen: www.infosvin.dk/Haandbog/Foder/Raavare, 15.07.2008
 Näringsvärden: Beräknade i EvaPig ver. 1.0.2.0; Sojamjöl
 Koefficienten för sisRp är från Sauvant et al. 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	30
	Digivande suggor	30
	Smågrisar	20
	Slaktgrisar	30

Kommentarer

Sojaböna innehåller substanser som minskar proteinutbytet i tarmen. Vid tillverkning av sojamjöl sker en uppvärmning som förstör dessa ANF. Kvar finns fortfarande ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner i tarmen hos nyavvanda grisar. Därför rekommenderas ingen eller låg inblandning i foder till denna kategori av djur.