

Vassle

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	5,5	Ca	g/kg Ts	8,7
Aska	g/kg Ts	86	P	g/kg Ts	7,3
Råprotein	g/kg Ts	115	Mg	g/kg Ts	1,3
Råfett	g/kg Ts	19	K	g/kg Ts	23,1
Växttråd	g/kg Ts	0	Na	g/kg Ts	7,7
NDF	g/kg Ts	0	Mn	mg/kg Ts	3,0
ADF	g/kg Ts	0	Se	mg/kg Ts	0,05
Stärkelse	g/kg Ts	0	Cu	mg/kg Ts	22
Socker	g/kg Ts	768	Zn	mg/kg Ts	17

NEv	MJ/kg Ts	12,4	Smältbarhet för fosfor		
NEs	MJ/kg Ts	12,2	Mjöl	%	90
OEsv	MJ/kg Ts	15,6	Pellets	%	90

Smältbarhet,%

Lysin	g/kg Ts	8,5	sisLys	g/kg Ts	7,6	89
Treonin	g/kg Ts	6,6	sisTreo	g/kg Ts	5,6	85
Metionin	g/kg Ts	1,8	sisMet	g/kg Ts	1,7	92
Cystin	g/kg Ts	2,0	sisCys	g/kg Ts	1,8	88
Met+Cys	g/kg Ts	3,8	sisMet+Cys	g/kg Ts	3,4	90
Tryptofan	g/kg Ts	1,5	sisTry	g/kg Ts	1,3	87
Valin	g/kg Ts	5,9	sisVal	g/kg Ts	5,1	87
			sisRp	g/kg Ts	93	81

Källor	Råanalys:	www.infosvin.dk/Haandbog/Foder/Raavare , 24.11.2006
	Mineralämnen:	www.infosvin.dk/Haandbog/Foder/Raavare , 24.11.2006
	Näringsvärden:	Beräknade från EvaPig version 1.0.2.0, Vassle, söt, torkad, skummad Koefficienten för sisRp är från Sauvant et al., 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	30
	Digivande suggor	20
	Smågrisar	20
	Slaktgrisar	20

Kommentarer

Vassle innehåller mycket mjölksocker som grisens egna enzymer har begränsad kapacitet att bryta ner. Den laktos som passerar tunntarmen fermenteras av bakterier i tjocktarmen. Detta kan leda gasbildning och tarmomvridning. Mängden mjölksocker som finns kvar beror på om vasslen fermenterat eller inte. Produkter som är tillsatta myrsyra har all laktosen kvar.