

Vasslepulver, söt vassle

Senast ändrad 110809

Ts	% av vara	96,5	Ca	g/kg Ts	8,5	
Aska	g/kg Ts	90	P	g/kg Ts	7,2	
Råprotein	g/kg Ts	131	Mg	g/kg Ts	1,5	
Råfett	g/kg Ts	22	K	g/kg Ts	21	
Växttråd	g/kg Ts	0	Na	g/kg Ts	6,6	
NDF	g/kg Ts	0	Mn	mg/kg Ts	3,1	
ADF	g/kg Ts	0	Se	mg/kg Ts	0,31	
Stärkelse	g/kg Ts	0	Cu	mg/kg Ts	2,0	
Socker	g/kg Ts	756	Zn	mg/kg Ts	21	
NEv	MJ/kg Ts	12,4	Smältbarhet för fosfor			
NEs	MJ/kg Ts	12,2	Mjöl	%	90	
OEsv	MJ/kg Ts	14,9	Pellets	%	90	
						Smältbarhet,%
Lysin	g/kg Ts	9,7	sisLys	g/kg Ts	8,6	89
Treonin	g/kg Ts	7,5	sisTreo	g/kg Ts	6,4	85
Metionin	g/kg Ts	2,1	sisMet	g/kg Ts	1,9	92
Cystin	g/kg Ts	2,3	sisCys	g/kg Ts	2,0	88
Met+Cys	g/kg Ts	4,3	sisMet+Cys	g/kg Ts	3,9	90
Tryptofan	g/kg Ts	1,7	sisTry	g/kg Ts	1,5	87
Valin	g/kg Ts	6,7	sisVal	g/kg Ts	5,8	87
			sisRp	g/kg Ts	106	81

Källor	Råanalys:	EvaPig ver. 1.0.2.0
	Mineralämnen:	Sauvant et al. 2004
	Näringsvärden:	Beräknade från EvaPig version 1.0.2.0, Vassle, söt, skummad, torkad Koefficienten för sisRp är från Sauvant et al., 2004

Riktvärden för max-inblandning, % av energin	Sinsuggor	30
	Digivande suggor	20
	Smågrisar	20
	Slaktgrisar	20

Kommentarer

Vassle innehåller mycket mjölksocker som grisens egna enzymer har begränsad kapacitet att bryta ner. Den laktos som passerar tunntarmen fermenteras av bakterier i tjocktarmen. Detta kan leda gasbildning och tarmomvridning.