



Uppdaterade gödslings- rekommendationer 2017

Maria Stenberg
Pernilla Kvarmo
Katarina Börling



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Planera gödslingen - rätt mängd på rätt plats



Rekommendationer
för gödsling och kalkning
2017

Jordbruksinformation 24 – 2016



Foto: Mårten Svensson

Vad är ändrat?

› Stråsäd-

- › Nya beräkningar med proteinreglering (höstvete och maltkorn)
- › Korrigeringsfaktor bröd vete 20 kg/ton

› Höstoljeväxter

- › Nya försök ger ändrad formel

› Vall

- › nya försök ändrar riktgivorna



› Sockerbetor

- › Normskörd ökad till 60 ton/ha
- › P och K-gödsling ändrad

› Majs

- › Ändrad K-gödsling

Antagna priser

› Spannmål

- › Höstvete bröd 1,30 kr
- › Höstvete foder 1,20 kr
- › Maltkorn 1,45 kr
- › Foderkorn 1,20 kr
- › Vall på rot 0,70 kr/kg ts

› Gödselmedel

- › Kväve 8 kr
- › Fosfor 18 kr
- › Kalium 8 kr

› Rörliga kostnader

- › 25 öre/kg varav
 - › P och K 9 öre/kg
 - › tröskning 3 öre/kg
 - › torkning 9 öre/kg
 - › frakt 5 öre/kg

› Priskvoter

- › = kr kg N/(kr/kg varorörliga kostnader)
- › Höstvete bröd 7,6
- › Höstvete foder 8,4
- › Maltkorn 6,7
- › Foderkorn 8,4



Uppdateringar höstvete och korn 2017

- › Räknat optimum på varje försök
- › Utgått från ett medeltal av optimum och skörd vid optimum
- › Använt proteinstege direkt vid optimumberäkningen
- › Bara använt brödsorter vid beräkning av optimum för brödveten
- › Räknat om korrektionsfaktorn för höstvete med proteinbetalning. Fast korrektionsfaktor, 20 kg/ton, trots att den varierar med priskvot.
- › Rekommendationer upp till 11 ton/ha för höstvete och 9 ton/ha för vårkorn
- › Mariboss - något lägre givor?
- › Högre rek för brödveten framför allt vid högre skördar
- › Något högre rek för fodervete i Mellansverige men något lägre i Skåne



Foto: Katarina Börling

Rekommendationer höstvete

Gröda	Skörd ton/ha	4	5	6	7	8	9	10	11
Norra Götaland och Svealand					Bröd ± 1 ton = ± 20 kg kväve				
Höstvete bröd	110 0	130 0	150 0	170 +5	190 +10	210 +15	230	250	
Höstvete foder	100 +5	120 +5	140 +5	155 +5	170 +5	185 +5	200	215	
Södra Götaland				Foder ± 1 ton = ± 15 kg kväve					
Höstvete bröd		125 +5	145 +5	165 +10	185 +15	205 +20	225	245	
Höstvete foder		105 -5	125 -5	140 -5	155 -5	170 -5	185	200	

Norra Götaland och Svealand

Förväntad skörd 7 ton


Förfrukt stråsäd, ingen stallgödsel

Rekommenderad giva blir

Brödvete 170 kg kväve

Fodervete 155 kg kväve

Bakgrund höstvete



Rekommendationer vårkorn

Gröda	Skörd, ton/ha	4	5	6	7	8	9
Norra Götaland + Svealand							
Korn malt		70 -5	90 -5	105 -5	120 -5	135	
Korn foder		70 -5	90 -5	105 -5	120 -5	135	
Södra Götaland							
Korn malt			85 -10	100 -10	115 -10	130	145
Korn foder		65 0	80 -5	95 -5	110 -5	125	140

Norra Götaland och Svealand

Förväntad skörd 6 ton


Förfrukt stråsäd, ingen stallgödsel

Rekommenderad giva blir

Malkorn 105 kg kväve

Foderkorn 105 kg kväve

Bakgrund vårkorn 2006-2015



Norra Götaland och Svealand
 Alla försök i detta område
Södra Götaland
 Alla försök i hela landet inkl. Skåne
 Lägre kvävegivor krävs för samma skörd
 jämfört med norrut

Platsanpassa gödslingen- Nollruta visar markens mineralisering



Höstvete efter rödklöver



Höstvete efter höstvete



Foto Pernilla Kvarmo
Cecilia Linge



- › Lena Engström (SLU) har gått igenom försök
- › 27 försök 2011-2016
- › Rekommendationerna tar hänsyn till:
 - › höstupptag
 - › mineralisering på våren
 - › skörd
- › Bestäm rekommenderad giva i tabell/ formel



Höstupptag 77 kg/ha Foto: Lena Engström

Rekommenderad giva = $159 - (1,1 * \text{kväveupptag höst}) - (1,1 * \text{mineralisering}) + (0,021 * \text{skörd})$

Rekommenderad kvävegiva vår

Höst 16 kg
170 kg

På nedanstående bilder kan du se exempel på hur höstrapsen sett ut under sen höst vid olika kväveupptag.
Ramarna är 1 kvadratmeter stora.



Höst 49 kg
135 kg

Höst 77 kg
104 kg

Höst 90 kg
90 kg

Foto: Lena Engström

Förväntad skörd 3 ton
Mineralisering ca 30 kg kväve vår/ försommar (medel)

Höstrapssnurra på www.greppa.nu



Rekommenderad kvävegiva för höstoljeväxter



Om du har vägt bladmassan, fyll i rutorna här

Bladmassans vikt (kg/m²) ?

Mineralisering (kg N/ha) ?

Skörd (kg/ha) ?

Rekommenderad giva kg N/ha

Om du har mätt/uppskattat höstens kväveupptag, fyll i rutorna här

Kväveupptag på hösten(kg N/ha) ?

Mineralisering (kg N/ha) ?

Skörd (kg/ha) ?

Rekommenderad giva kg N/ha

Exempel på hur höstrapsen kan se ut vid olika höstupptag. Ramarna är 1 kvadratmeter stora.



Bakgrund ändring vall

- › Bodil Frankow Lindberg (SLU) har jämfört nyare och äldre försök
- › Sju nyare försöksserier
 - › Treskördesystem och tidig förstaskörd
 - › Ogödslade led saknas i vissa serier
 - › Flera har inte uppnått maximal ts-skörd
- › Bodil har delat upp resultaten i
 - › Gräs - traditionella arter (timotej, ängssvingel)
 - › Gräs – rörsvingelhybrider
 - › Ingen eller lite klöver
 - › Medelhög klöverhalt
 - › Hög klöverhalt
- › Få försök, stor spridning
- › Mycket höga skördar, 11-14 ton ts
- › Högre respons i gräsvallarna jämfört med i äldre försök
- › Behövs fler försök främst med klöver/ gräsvall



Foto: Mårten Svensson

Uppdateringar vall 2017

- › Utgår från Bodil Frankow Lindbergs sammanställning för gräsvallar
- › Samma rekommendationer för olika gräsarter
- › Räknar ner för olika klöverhalt liksom tidigare för 10, 20, 40% klöver
- › Liknande rekommendationer som tidigare vid medelskördar, trots lägre kvävepris
- › Högre rekommendationer vid höga skördar och fyra skördar



Foto: Mårten Svensson

Planerade uppdateringar 2018

- › Vårraps
 - › Vårraps 3000: Lena Engström ska utvärdera försöksresultat
- › Mikronäring
 - › Karin Hamnér ska se över
- › Vi är öppna för dialog ☺
 - › Kom med inspel
 - › Tipsa om försök



Foto: Janne Andersson