

Plan R3-1002

Försök med olika mullråämnens-, kalknings- och växtnäringsnivåer

De "Permanent kalkningsförsöken" är numera ett, Röbbäcksdalen i Västerbotten. Försöksserien startade 1962.

Försöksplan:

Mullråämnensnivåer:

- I. Skörderesterna återförs
- II. Skörderesterna bortföres

Kalkningsnivåer:

- A. Utan kalk
- B. Uppkalkning till 70% basmättnadsgrad och bibehållande av detta kalktillstånd
- C. Uppkalkning till 100% basmättnadsgrad och bibehållande av detta kalktillstånd.

Växtnäringsnivåer:

- 1. Halv ersättning av P och K
- 2. Hel ersättning av P och K
- 3. Dubbel ersättning av P och K

Fältplan:

Trefaktorförsök med split-split-plot design, 2x3x3=18 försöksled, 3 samrutor, totalt 54 rutor. Bruttoreuta 120 m².

Skörderestbehandling:

I mullråämnensnivå A tillses att skörderesterna sprids ut jämnt över hela bruttorutan, och att den halm som ev. hamnar utanför rutan vid tröskningen verkligen återförs till rätt ruta. I mullråämnensnivå B bortföres halmen. OBS. Ingen vägning!

Gödning:

Kvävegödning, kg/ha:

Växtnäringsnivå

1	2	3	
20	40	80	Vårstråsådd med vallinsådd
0	20	40	Årter
30	60	120	Övriga grödor

PK-gödsling:

PK-mängderna, halv, hel eller dubbel ersättning beräknas för fyraårsperioder med ledning av bortförseln närmast föregående fyraårsperiod. Givorna 2018 och 2020 bygger på beräknad bortförsel 2013-2016.

Underhållskalkning

Underhållskalkning utförs vart 4:e år. Mängderna bestäms med ledning av T- och S-analyser som utförs på jordprov av matjord, som tas på hösten vart fjärde år, 2008, 2012, 2016, 2020 osv. Röbbäcksdalen kalkades ej 1998 (inget behov). Röbbäcksdalen kalkades våren 2018, nästa gång 2022.

Växtföljd:

Följer det aktuella skiftets.

Graderingar

Rutvisa graderingar i tillämpliga fall av planttäthet vår, slutenhet vår, grönskott, bristsymptom, parasitangrepp, stråstyrka vid skörd och botanisk sammansättning vid skörd. Datum för axgång graderas ledvis.

Nederbörd

Uppgift om nederbörden noteras på protokoll från och med gödslingen och fram till skörden och insändes tillsammans med skördekortet.

Skörd:

Kärna, frö, knölar, grönmassa vägs rutvis vid skörd. Halm och blast vägs ej.

Provtagning:

Jord: Rutvis prov av matjord (0-20 cm) och alv (40-60 cm).
Matjord vart fjärde år, på hösten år 2012, 2016, 2020 osv.
Tills vidare tas inga alvprover.

Gröda: Kärna/frö Ledvisa, invägda prover, 1000 g.

Grönmassa Rutvisa vid varje skörd, ca 500 g, exakt vikt på etiketten

Knölar ledvisa, 6 kg.

Halm/blast ledvis från mullråämneshöjd B, dvs 9 prover.

OBS! Halm/blast från leden i mullråämneshöjd B skall ej vägas, endast provtas för kemisk analys.

Provhantering

Alla prover till: *Inst. för mark och miljö*
Gerda Nilssons väg 5 756 51 Uppsala
Att. Annika Hansson 076-8460843 018-671160 018-673015

En analysbeställning skall medfölja alla prover, både växt och jord, som skickas för analys. Använd gärna den analysbeställning som utsändes från avd. 3 SLU. Packlista i vanlig ordning skall också alltid finnas.

Analyser:	Kärna:	Ts, renvikt, rymdvikt 1000-kornv , N
	Frö:	Ts, N
	Knölar:	Ts, N
	Grönmassa:	Rutvis Ts, ledvis N
	Halm:	N (gäller mullråämnescnivå B).
	Jord:	Rutvis pH, P-AL, K-AL, Ca-AL, Mg-AL, P-HCl, K-HCl, T + S.

Övrigt Alla åtgärder, provtagningar etc skall signeras med datum på fältkortet.
Gör en notering även när beställd åtgärd ej utförts.

Kontaktperson Gunnar Börjesson, SLU, Inst. för mark och miljö, 018-67 27 53