

Plan R3-9001

Bördighetsförsöken M-län

Omfattning: Serien omfattar f.n. fyra lokaler, Fjärdingslövsgården, Orupsgården, Borgeby (Örja), och Ekebo. S:a Ugglarp avslutades 2008. Försöken är inne i sitt 15:e omlopp. De anlades 1957.

Försöksplan I. Kreaturshållande växtföljd
II. Kreaturslös växtföljd

- A. Ingen PK-gödsling
- B. Ersättning av bortfört PK
- C. Ersättning + 15 P och 40 K, kg per ha och år (60 resp 160 kg per ha och växtföljd)
- D. Ersättning + 30 P och 80 K, kg per ha och år (120 P och 320 K, kg per ha och växtföljd)

- 1. 0 kg/ha år Ingen N-gödsling
- 2. 50 "- 200 N kg per ha och växtföljd.
- 3. 100 "- 400 N " "
- 4. 150 "- 600 N " "

Fältplan 2x4x4=32 led, 2 block à 32 led=64 rutor. Bruttoreutans storlek 125 m² för Fjärdingslövsgården och Ekebo, för Borgeby (Örja) 112,5 m².

Block I																Block II															
Växtföljd I																Växtföljd II															
1	2	3	4	3	4	1	2	4	1	2	3	2	3	4	1	4	2	3	1	2	1	4	3	1	3	2	4	3	4	1	2
A				B				C				D				B				A				C				D			
1	2	3	4	3	4	1	2	4	1	2	3	2	3	4	1	4	2	3	1	2	1	4	3	1	3	2	4	3	4	1	2
Växtföljd II																Växtföljd I															

Orupsgården.

Rutorna 33-48 och 17-32 är flyttade in i fältet och ligger nu innanför rutorna 1-16 och 49-64 sett från vägen.

Orupsgårdens bruttoruta $18 \times 6,25 = 112,5 \text{ m}^2$.

Block I																Block II															
Växtföljd II																Växtföljd I															
1	2	3	4	3	4	1	2	4	1	2	3	2	3	4	1	4	2	3	1	2	1	4	3	1	3	2	4	3	4	1	2
A				B				C				D				B				A				C				D			
1	2	3	4	3	4	1	2	4	1	2	3	2	3	4	1	4	2	3	1	2	1	4	3	1	3	2	4	3	4	1	2
Växtföljd I																Växtföljd II															

Rolsberga <--

E22

--> Hörby

Växtföljd

Kraftig infektion av klumprotsjuka har medfört att havre ersatte vår-oljeväxter på Orup och Ekebo 2010 och 2014. Fågelangrepp har sedan motiverat att såväl oljeväxter som havre byts mot oljelin på samtliga försöksplatser fr o m 2018.

År	Växtföljd	
	I	II
Oml 14	Oml 15	
13	17	Korn
14	18	Vall
15	19	Höstvete
16	20	Sockerb.

Vallen skördas en gång i växtföljd I.

Skörderest-behandling

Växtföljd I: Stråsädeshalm och sockerbetsblast bortföres.

Växtföljd II: All halm och blast nedbrukas.

PK-gödsling

Lika stor mängd P och K, som under ett växtföljdsomlopp bortförts med grödan, skall (i PK-nivå B, C och D) tillföras under nästkommande omlopp. I PK-nivå C och D sker dessutom en svag respektive stark uppgödsling.

Den för hela växtföljdsomloppet avsedda PK-mängden uppdelas i två lika stora delgivor varav den ena ges på våren till korngroddan och den andra på hösten efter skörd av höstvete.

M-serien: v-2009, h-2011, v-2013, h 2015, v-2017, **h-2019**
(h- och v- står för höst och vår)

Varje försöksled gödslas individuellt enligt lista som utsänds från avdelningen.

N-gödsling Kvävet tillförs som kalkammonsalpeter (N 28) på våren i engångsgivor i följande mängder, N, kg/ha.

Gröda	N-nivå			
	1	2	3	4
Korn	0	30	60	90
Vall/oljelin	0	50	100	150
Höstvete	0	50	100	150
Sockerbetor	0	70	140	210

1) Se ovan under växtföljd

Flytgödsel I **växtföljd I** tillförs alla led flytgödsel, vilken sprids på hösten efter höstvetet, dvs. 2007, 2011, 2015, 2019 osv. Från och med 2007 tillförs flytgödsel i stället för fastgödsel och givan är höjd till 25 ton/ha. Ingen flytgödsel tillförs i växtföljd II.

Övrig gödsling Sockerbetorna erhåller 200 kg/ha Besal över hela försöket. En gång i växtföljden tillförs 300 kg/ha kieserit (17 % Mg, 23 % S) över hela försöket. Från och med 1998 görs detta på våren före vall/oljelin (f.d. våroljeväxter/havre). Nästa gång våren 2022. Kalkning har tidigare utförts på försöken 1981 (2 ton Cao/ha på Fjärdingslöv och Örja, resp. 1 ton CaO/ha på Orup och Ekebo), 1996 (Ignaberga 4 ton/ha på Orup och Ekebo) och 2013 (Nordkalk Plus 8,3 ton/ha på Orup och Ekebo). I oktober 2014 utfördes kalkning på alla skånska försök med Nordkalk Plus 5,4 ton/ha (50% CaO). Kalkning bör fortsättningsvis ske vart 5:e år. **Mikronäringsnivå (t ex bor och magnesium) behöver justeras.**

Bekämpningsåtgärder Bekämpning av ogräs, sjukdomar och skadedjur utförs vid behov.

Graderingar Stråsäd: rutvis planttäthet vår (0-100), ev. bristsymptom och parasitangrepp (0-100), stråstyrka vid skörd (0-100). Ledvis datum för axgång,
Oljelin: Planttäthet vår (0-100), ev. bristsymptom och sjukdomar (0-100), stjälkstyrka vid skörd (0-100).
Vall: Slutenhet vår (0-100), botanisk sammansättning vid skörd (andel baljv., gräs, övrigt)
Sockerbetor: Planttäthet vår (0-100), ev. bristsymptom och sjukdomar (0-100).

Skörd

Stråsäd: Kärna väges rutvis. Halm väges rutvis i **växtföljd I**

Oljelin: Frö väges rutvis.

Vall: Skördas en gång. Grönmassa väges rutvis.

Sockerbetor: 2x10 m² per bruttoruta skördas och vägs. Blast väges i växtföljd I, se nedan.

Provtagning

Kärna/frö: Ledvisa exakt invägda prov (ca 1000 g).

Halm: Ledvisa prov, ca 0,5 kg för ts och kemisk analys, från **växtföljd I**. Inga halmprov från växtföljd II.

Grönmassa: Ledvis invägda prov.

Sockerbetor: Ett prov per bruttoruta till SSA-analys även då mer än en 10 m² ruta har skördats. Rutvis mosprov till Avd. 3

Sockerbetsblast: Rutvisa prov motsvarande blast från 10 betor i växtföljd I. Ingen provtagning i växtföljd II. Obs. Fr.o.m. 2016 görs även bestämning av förhållande beta/blast ifråga om vikt. Behandling (vägning, ts-bestämning) av betor sker utöver avtal.

Jord: Fr. o m 2015 rutvisa prov av matjord (0-20 cm) i varje växtföljdsomlopp (2003 rutvisa) och rutvisa prov av alv (40-60 cm) i vartannat omlopp (1999 rutvisa), efter skörd av höstvetete, före spridning av flytgödsel och PK.

<u>M-serien:</u>	matjord	h-2015, h-2019
	alv	h-2015

Tills vidare tas inga alvprover

Uttagning av jordprov: Ett prov skall bestå av minst 10 delprov från varje aktuell ruta. Undvik synliga växtrester i jordproven. Skrapa bort den översta cm jord vid provtagningen. Blir provet för stort samlas alla delprov i hink, blandas noga och ett mindre prov tas ut.

Stallgödsel: Provtages i samband med spridning.

Provhantering

Alla prov utom sockerbetsproven till: *Inst. för mark och miljö*
Gerda Nilssons väg 5 756 51 Uppsala
Att. Annika Hansson 076-8460843 018-671160 018-673015

Sockerbetor till *Danisco*, mosprov och blast till: *Inst. för mark och miljö*
Gerda Nilssons väg 5 756 51 Uppsala
Att. Annika Hansson 076-8460843 018-671160 018-673015

En analysbeställning skall medfölja alla prover, både växt och jord, som skickas för analys. Använd gärna den analysbeställning som utsändes från avd 3, SLU. Packlista i vanlig ordning skall också alltid finnas.

Analys Samtliga analyser utföres på ledvisa prover. Jordprov arkiveras rutvis.

<u>Kärna:</u>	Ts, renvikt, Rymdvikt, 1000-kornv, N, P, K.
<u>Frö:</u>	Ts, renvikt, N, P, K
<u>Halm</u>	ts, N, P, K
<u>Blast</u>	N,P,K
<u>Grönmassa:</u>	Ts, N, P, K
<u>Sockerbetor:</u>	SSA-analys
<u>Sockerbetsmos:</u>	Ts, N, P, K
<u>Sockerbetsblast:</u>	Ts, N, P, K
<u>Matjord och alv:</u>	pH, P-AL, K-AL, total-C* och N.
	*) på Fjärdingslöv även organiskt-C.

Flytgödsel: Ts, aska, tot-N, NH₄-N, P, K.

Övrigt Alla åtgärder, provtagningar etc skall signeras med datum på fältkortet. Gör en notering även i de fall beställd åtgärd ej utförts.

Kontaktperson Gunnar Börjesson, SLU, Inst. för mark och miljö, 018-67 27 53